



ONCE-DAILY

INGREZZA®
(valbenazine) capsules

¿Los movimientos involuntarios le resultan **vergonzosos?**

Podría ser discinesia tardía (DT), una afección causada por la administración de ciertos medicamentos para la salud mental.

Consulte la página 10 para obtener una guía sobre cómo hablar con su médico sobre la DT.



La cantautora **Carrie Wilson** ayuda a otras personas a enfrentarse al estigma, hablar sobre los síntomas y preguntar sobre cómo reducir los movimientos de la DT con INGREZZA. **Obtenga más información en el interior.**

Carrie Wilson es portavoz remunerada de INGREZZA/Neurocrine Biosciences, Inc. No se le ha diagnosticado discinesia tardía (DT) y no toma INGREZZA.

Representaciones de actores

Información importante

Uso aprobado

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o de INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) son medicamentos de venta con receta que se utilizan para tratar a adultos con movimientos en el rostro, la lengua, u otras partes del cuerpo que no pueden controlarse (discinesia tardía).

Se desconoce si INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Discinesia tardía: Movimientos corporales persistentes e involuntarios

Si tiene movimientos persistentes e involuntarios y ha tomado determinados medicamentos para la salud mental, es hora de preguntarle a su proveedor de atención médica sobre una afección tratable llamada discinesia tardía (DT).



**Los movimientos de la DT
pueden producirse en
cualquier parte del cuerpo:**

ROSTRO

BOCA, LABIOS, LENGUA, MANDÍBULA, OJOS

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

BRAZOS, TORSO, MANOS/DEDOS

PARTE INFERIOR DEL CUERPO

PIERNAS, PIES/DEDOS

Dé un paso importante.

Comprenda la causa de sus movimientos involuntarios
y aprenda sobre el tratamiento.

Visite [INGREZZA.com/Movements](https://www.ingrezza.com/Movements)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

No tome INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o cualquiera de los ingredientes presentes en INGREZZA o en INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

¿Qué medicamentos pueden causar DT?

Es posible que le hayan recetado determinados medicamentos para la salud mental (antipsicóticos) para tratar una de estas afecciones:

- Depresión
- Esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo
- Trastorno bipolar
- Trastorno de ansiedad



Vea una lista de medicamentos que se sabe que causan DT en [INGREZZA.com/Meds-to-Monitor](https://www.ingrezza.com/Meds-to-Monitor)

Ciertos medicamentos recetados utilizados para tratar trastornos gastrointestinales (metoclopramida y proclorperazina) también pueden causar DT.

Si actualmente está tomando algún medicamento antipsicótico, no interrumpa, ajuste ni cambie su medicamento sin hablar con su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:


- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluidas reacciones que causan inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar, sarpullidos que incluyen picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas). La inflamación de la garganta puede ser mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.
- **Adormecimiento y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE lo afectan. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también pueden causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.
- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Vivir con discinesia tardía

Es poco probable que la DT mejore por sí sola, pero puede tomar el control hablando con su proveedor de atención médica de inmediato.

Incluso los movimientos leves o moderados por DT pueden afectar negativamente su trabajo, vida social y autoestima.* Es posible que sienta que los movimientos involuntarios crean una impresión no deseada en las personas que conoce.



de las personas con DT
informaron que tienen que cancelar planes sociales y evitar a otras personas o actividades públicas debido a sus síntomas de DT.*

*En una encuesta a 150 adultos estadounidenses diagnosticados con DT. Realizado por The Harris Poll en nombre de Neurocrine Biosciences entre el 12 y el 31 de diciembre de 2024.

“Debido a mi DT, me avergonzaba estar en público. Masticaba mucho chicle para ocultar el movimiento de mis mandíbulas. No asistía a salidas de trabajo, reuniones familiares. Me perdí muchos acontecimientos porque me excluía”.

– Steve, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía

Steve fue compensado por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir su historia



Vea historias de pacientes reales en
[INGREZZA.com/Stories](https://www.ingrezza.com/Stories)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una grave condición médica que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, rigidez muscular, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, sudoración excesiva o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.
- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar, o problemas para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores), o caídas.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

¿Le está afectando la DT?

**Ha trabajado mucho para mejorar su salud mental.
No deje que los movimientos involuntarios le frenen.**

Tomar el control comienza por preguntarle a su proveedor de atención médica sobre el diagnóstico correcto y un tratamiento para sus movimientos involuntarios.



“Para mí, era importante seguir buscando respuestas a mis movimientos involuntarios. No iba a aceptar un ‘no’ como respuesta”.

– Davitria, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Davitria por compartir su historia



Diríjase a la página 10 para obtener una **Guía de análisis con su médico**. Esto le ayudará a hablar con su médico sobre la DT.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE con otros medicamentos puede provocar graves efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica especialmente si: toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Carnie Wilson, cantante y compositora nominada a los Grammy, aporta su pasión por la defensa de la comunidad con DT a través de ConnectING with Carnie™.

Carnie Wilson es portavoz remunerada de INGREZZA/Neurocrine Biosciences, Inc. No se le ha diagnosticado discinesia tardía (DT) y no toma cápsulas de INGREZZA® (valbenazine).



En una serie de conversaciones sinceras con personas y familias afectadas por la DT, vea cómo otras personas se enfrentan al estigma y hablan abiertamente sobre sus síntomas. Vea los videos en: ConnectingWithCarnie.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con corea asociada con la enfermedad de Huntington incluyen somnolencia y cansancio, picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas), sarpullidos, y problemas para dormirse o permanecer dormido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Carnie dice: ¡Exprésese!

“Lo que realmente me afecta es ver a la gente sufrir en silencio. ¡Quitémonos la vergüenza de encima!”



“Cuando una persona experimenta estos movimientos, o tal vez alguien cercano a ella los está observando, realmente les diría: ‘No esperen’. Acudan a un proveedor de atención médica. Ellos están ahí. Son útiles. Conocen tratamientos como INGREZZA”.

– Allison, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Allison por compartir su historia

“Para mí, fue útil encontrar otras historias de personas, cómo atravesaron su experiencia con la DT o cómo encontraron ayuda. Al relacionarme con los demás y aprender de ellos, pude superar lo que estaba experimentando”.

– Moira, vive con depresión y discinesia tardía

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Moira por compartir su historia



Únase a la conversación en:
ConnectingWithCarnie.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: **depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas**. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

No tome INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o cualquiera de los ingredientes presentes en INGREZZA o en INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Cómo cuidar a alguien con discinesia tardía

Puede ser difícil decirle a un ser querido que usted ha notado que tiene movimientos involuntarios. Pero cuanto más pronto lo sepa, más rápido podrá tomar el control hablando con un proveedor de atención médica sobre el diagnóstico y el tratamiento.

“Me alegro de haberle dicho algo a Amy sobre sus movimientos involuntarios, porque aunque los estuviera haciendo, no tenía ni idea de que los estaba haciendo. Si no lo hubiésemos hablado, nunca hubiésemos llegado a donde estamos ahora, ni nos hubiéramos enterado de INGREZZA”.


– Kim (izquierda), cuidadora de Amy, quien vive con depresión y DT

Amy y Kim fueron compensadas por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir sus historias



¡Está bien expresarse!

Su ser querido puede necesitar su apoyo.



de las personas con DT informaron que hubieran deseado que se les haya animado a hablar con un proveedor de atención médica sobre sus movimientos involuntarios antes*

*En una encuesta a 150 adultos estadounidenses diagnosticados con DT. Realizado por The Harris Poll en nombre de Neurocrine Biosciences entre el 12 y el 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluidas reacciones que causan inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar, sarpullidos que incluyen picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas). La inflamación de la garganta puede ser mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



“En el caso de la DT, existen tratamientos, como INGREZZA, que están aprobados y son eficaces. Creo que es importante saberlo”.

“Mi papel como cuidador fue ayudar a Moira a permanecer en el proceso de buscar ayuda, que finalmente recibió”.

– Forrest (derecha), cuidador de Moira, quien vive con depresión y DT

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Moira y Forrest por compartir sus historias



¿Necesita más recursos para cuidadores?

Encuentre consejos, herramientas e

información en [INGREZZA.com/Care-Partner](https://www.ingrezza.com/Care-Partner)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Adormecimiento y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE lo afectan. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también pueden causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.
- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.
- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una grave condición médica que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, rigidez muscular, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, sudoración excesiva o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Hablar con su médico

Dé un primer paso importante ahora mismo completando nuestra Guía de análisis con su médico para su próxima cita, ya sea en persona, por teléfono o en línea.

1. Tengo movimientos involuntarios en: [Marque todo lo que corresponda].

- ☐ Rostro/mandíbula ☐ Boca/lengua ☐ Torso
☐ Brazos/manos ☐ Piernas ☐ Pies/dedos de los pies

2. He tomado medicamentos para la salud mental durante:

- ☐ Menos de 3 meses ☐ 3 meses a 1 año ☐ 1 año o más

3. Noté por primera vez los movimientos involuntarios:

- ☐ Menos de 3 meses ☐ 3 meses a 1 año ☐ 1 año o más

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar, o problemas para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores), o caídas.

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE con otros medicamentos puede provocar graves efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica especialmente si: toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

4. Los movimientos involuntarios afectan a mi rutina diaria:

☐ Para nada ☐ Un poco ☐ Mucho

5. Los movimientos corporales involuntarios afectaron mi vida de las siguientes maneras:

Impacto físico (p. ej., actividades domésticas, dormir, escribir, teclear):

Impacto social (p. ej., relaciones personales, empleo):

Impacto emocional (p. ej., frustración, ansiedad, preocupación):

6. Algunos problemas de salud en mi historial médico incluyen: [Marque todo lo que corresponda]. (Esto puede ser importante para que su médico elija el mejor tratamiento).

☐ Diabetes ☐ Presión arterial alta ☐ Colesterol alto ☐ Consumo de alcohol o sustancias
☐ Cardiopatía o ataque al corazón reciente ☐ Problemas del ritmo cardíaco
☐ Problemas hepáticos o renales ☐ Otro

7. Cuando se trata de tomar medicamentos, prefiero algo que pueda:

[Marque todo lo que corresponda].

☐ Tomarse una vez al día ☐ Tomarse con o sin alimentos ☐ Tomarse a cualquier hora del día
☐ Ser fácil de empezar/conseguir una dosis eficaz (con pocos o sin ajustes de dosis)
☐ Espolvorearse sobre la comida (en lugar de tener que tragarse entero) ☐ Otro

8. Otras preguntas o inquietudes que tengo sobre el tratamiento de la DT:

[Marque todo lo que corresponda].

☐ Cuánto tiempo se tarda en actuar ☐ Cualquier posible efecto secundario ☐ Costo de la receta y cobertura
☐ Si puedo tomarlo con mis otros medicamentos ☐ Otra

Es poco probable que la DT mejore por sí sola, pero puede tomar el control hablando con su proveedor de atención médica. Use este espacio para escribir cualquier pregunta adicional que pueda tener.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con corea asociada con la enfermedad de Huntington incluyen somnolencia y cansancio, picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas), sarpullidos, y problemas para dormirse o permanecer dormido.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Tratar la DT con INGREZZA

Se ha demostrado que INGREZZA reduce la DT, **siempre en una sola cápsula, una vez al día, y que es el tratamiento recetado n.º 1.**

Las cápsulas de INGREZZA[®] (valbenazine) se utilizan para tratar a adultos con DT en la cara, la lengua y otras partes del cuerpo. Se desconoce si INGREZZA es seguro y eficaz en niños.

Reducción de la discinesia tardía

ALCANZAR LA REMISIÓN

Sin movimientos o movimientos mínimos a las 48 SEMANAS en el 59% de las personas*

MEJORA SIGNIFICATIVA†

>10 veces Reducción de la DT a las 6 SEMANAS frente al placebo‡

*En una evaluación posterior al estudio clínico del ensayo KINECT 4, el 59% (61/103) de las personas que completaron el ensayo y tomaron INGREZZA (40 mg y 80 mg) alcanzaron un puntaje de 1 o menos para cada parte del cuerpo medida con AIMS en la semana 48. Los resultados son de naturaleza descriptiva.

†INGREZZA se estudió en un ensayo clínico de 6 semanas. Un total de 234 personas participaron en el estudio. Los resultados se basaron en 79 personas que tomaron la dosis recomendada de 80 mg.

‡Reducciones basadas en el cambio promedio desde el inicio hasta la semana 6 en una escala de severidad del movimiento involuntario. Resultados para INGREZZA 80 mg -3.2 (n = 79) frente a placebo -0.1 (n = 76) en un estudio clínico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Representaciones de actores

Lograr el objetivo de la remisión de la DT

► **9 de cada 10 PERSONAS CON DT**

coinciden en que el objetivo del tratamiento de la DT es lograr movimientos mínimos o inexistentes (remisión)*

*En una encuesta a 150 adultos estadounidenses diagnosticados con DT. Realizado por The Harris Poll en nombre de Neurocrine Biosciences entre el 12 y el 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Dosificación simple con INGREZZA

INGREZZA facilita la administración desde el principio



Comienza en una dosis eficaz



También disponible en formulación para espolvorear



Siempre una cápsula, una vez al día



Tomada en cualquier momento



Con o sin alimentos



Se puede agregar a la mayoría de los regímenes de salud mental estables



¿Tiene problemas para tragar píldoras?

Hay otra forma de tomar INGREZZA

Obtenga información sobre las cápsulas de INGREZZA

SPRINKLE[®] (valbenazine) en [INGREZZA.com/TD-Sprinkle](https://www.ingrezza.com/TD-Sprinkle)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

No tome INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o cualquiera de los ingredientes presentes en INGREZZA o en INGREZZA SPRINKLE.

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluidas reacciones que causan inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar, sarpullidos que incluyen picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas). La inflamación de la garganta puede ser mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).





No es el tamaño real

Representación de actor

Más de
▶ **8 de cada 10 PERSONAS CON DT**
notificaron que deseaban evitar ajustar sus dosis del tratamiento de la DT*

*En una encuesta a 150 adultos estadounidenses diagnosticados con DT. Realizado por The Harris Poll en nombre de Neurocrine Biosciences entre el 12 y el 31 de diciembre de 2024.

A partir del día 1, **empezará** con una dosis eficaz.



No es el tamaño real

Tres concentraciones eficaces significan una **administración simple sin ajustes complejos de la dosis.**

Su profesional de atención médica comenzará administrándole 40 mg durante 1 semana. Podrá seguir recibiendo 40 mg o aumentar a 60 mg u 80 mg, según sus necesidades de tratamiento. La dosis recomendada de INGREZZA es de 80 mg.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Adormecimiento y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE lo afectan. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también pueden causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Con INGREZZA, puede seguir **tomando** la mayoría de los medicamentos de salud mental

En un estudio clínico, el estado psiquiátrico permaneció estable en general en las personas que tomaron las cápsulas de INGREZZA[®] (valbenazine), incluidas aquellas que también tomaron medicamentos para:



- Depresión
- Trastorno bipolar
- Esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo
- Trastorno de ansiedad

No deje de tomar INGREZZA sin antes hablar con su proveedor de atención médica.



“Mi psiquiatra me dijo que podía seguir tomando el mismo medicamento que ya tomaba para mi trastorno bipolar y, a la vez, tomar INGREZZA. Eso fue muy importante para mí porque por fin había encontrado algo que funcionaba. Así que encontrar algo que funcionara para mi DT y que no interfiriera con mi medicamento para el trastorno bipolar fue una ventaja”.

– Nycole, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Nycole por compartir su historia

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Representación de actor

Las personas que toman INGREZZA para la DT pueden seguir con su dosis actual de la mayoría de los medicamentos para la salud mental.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, que incluyen:



- Medicamentos de venta con receta
- Medicamentos de venta libre
- Vitaminas
- Suplementos a base de hierbas

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una grave condición médica que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, rigidez muscular, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, sudoración excesiva o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.
- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar, o problemas para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores), o caídas.

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Representaciones de actores

Ser el tratamiento recetado n.º 1 no es el único logro del que estamos orgullosos

- 20 estudios clínicos con 576 personas con DT que tomaron INGREZZA
- 8 años de experiencia en el mundo real
- Más de 1 millón de recetas totales desde 2017
- 3 opciones de dosificación simples y eficaces
- Comienza con una dosis eficaz

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE con otros medicamentos puede provocar graves efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica especialmente si: toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



“Descubrir que había un tratamiento disponible para mi discinesia tardía fue muy emocionante y me dio mucha esperanza”.

“Descubrí que INGREZZA es eficaz y tolerable para mí. Mi médico me dijo que podía tomarlo con antipsicóticos. Por lo que, para mí, fue beneficioso”.

- Bethany, vive con esquizofrenia y DT

Bethany fue compensada por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir su historia

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con corea asociada con la enfermedad de Huntington incluyen somnolencia y cansancio, picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas), sarpullidos, y problemas para dormirse o permanecer dormido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

INBRACE[®]

PROGRAMA DE APOYO

Dedicado a **ayudarle** en su experiencia en el tratamiento

El Programa de apoyo INBRACE[®] está diseñado para ayudar a los pacientes a quienes se les receta INGREZZA[®] (valbenazine) en cápsulas a través de una variedad de programas de asistencia financiera.



Tarjeta de descuento en copagos

Si es elegible, se puede aplicar automáticamente una tarjeta de ahorros en la farmacia, lo que puede ayudarlo a ahorrar dinero en su receta de INGREZZA.*

*Esta oferta es válida solo para pacientes que tienen un seguro comercial (no financiado por el gobierno). Se aplican términos y condiciones adicionales.

Una vez que se haya autorizado la cobertura, INGREZZA se le enviará directamente por correo exprés.

INGREZZA está disponible a través de una red seleccionada de farmacias especializadas y afiliadas locales. Una farmacia especializada proporciona medicamentos que generalmente no están disponibles en su farmacia minorista local.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

No tome INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o cualquiera de los ingredientes presentes en INGREZZA o en INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



Representación de actor

Programa de inicio de INGREZZA

El Programa de inicio de INGREZZA es una prueba gratuita (suministro para un mes) de cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) disponible para pacientes nuevos.* Su proveedor de atención médica puede inscribirlo en el Programa de inicio de INGREZZA descargando el formulario de inscripción del sitio web de INBRACE y enviando el formulario completado en su nombre.

Programa de asistencia al paciente de INGREZZA

Si no tiene cobertura para medicamentos de venta con receta para INGREZZA y carece de recursos financieros para pagar el medicamento, es posible que pueda recibir su receta sin costo alguno a través del Programa de asistencia al paciente de INGREZZA.† Su proveedor de atención médica puede ayudarlo a solicitar el programa o llame al 1-84-INGREZZA para obtener más información.

*Este programa no está supeditado a una compra de ningún tipo. El producto entregado en virtud de este programa de prueba gratuito no puede presentarse para reembolso a ningún tercero pagador. Nos reservamos el derecho de modificar o cancelar el programa en cualquier momento.

†Se aplican términos y condiciones adicionales.



Para obtener más información sobre el Programa de apoyo INBRACE®, llame al 1-84-INGREZZA (1-844-647-3992) de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del este, de lunes a viernes, o visite [INGREZZA.com/Support](https://www.ingrezza.com/Support)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluidas reacciones que causan inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar, sarpullidos que incluyen picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas). La inflamación de la garganta puede ser mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

Información importante

Usos aprobados

Las cápsulas de INGREZZA[®] (valbenazine) o de INGREZZA[®] SPRINKLE (valbenazine) son medicamentos de venta con receta que se utilizan para tratar a adultos con:

- movimientos en el rostro, la lengua, u otras partes del cuerpo que no pueden controlarse (discinesia tardía).
- los movimientos involuntarios (corea) de la enfermedad de Huntington. INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE no curan la causa de los movimientos involuntarios y no tratan otros síntomas de la enfermedad de Huntington, como los problemas con el pensamiento o las emociones.

Se desconoce si INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

No tome INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o cualquiera de los ingredientes presentes en INGREZZA o en INGREZZA SPRINKLE.

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluidas reacciones que causan inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar, sarpullidos que incluyen picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas). La inflamación de la garganta puede ser mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.
- **Adormecimiento y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE lo afectan. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también pueden causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).

- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.
- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una grave condición médica que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, rigidez muscular, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, sudoración excesiva o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.
- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar, o problemas para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores), o caídas.

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE con otros medicamentos puede provocar graves efectos secundarios. Informe a su proveedor de atención médica especialmente si: toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminooxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con corea asociada con la enfermedad de Huntington incluyen somnolencia y cansancio, picazón en áreas rojas elevadas de la piel (ronchas), sarpullidos, y problemas para dormirse o permanecer dormido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.



Representaciones de actores

Tratar los movimientos debido a la DT con INGREZZA



Comienza en una dosis eficaz



Siga tomando la mayoría de los medicamentos de salud mental



Tome el control: comience por preguntarle a su proveedor de atención médica sobre INGREZZA.

Visite INGREZZA.com/TD para obtener más información sobre el tratamiento

Información importante

Uso aprobado

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o de INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) son medicamentos de venta con receta que se utilizan para tratar a adultos con movimientos en el rostro, la lengua, u otras partes del cuerpo que no pueden controlarse (discinesia tardía).

Se desconoce si INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, entre ellos: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio especialmente cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos, o sentimientos. Esto es especialmente importante cuando inicie su tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 22–23 y la [Información de prescripción](#) completa adjunta, incluido el Recuadro de advertencia, y la [Guía del medicamento](#).



©2025 Neurocrine Biosciences, Inc. Todos los derechos reservados. CP-VBZ-US-3784v2 12/2025